



SC DOBSI MED SRL
Str. Turnului Nr. 12, Tel/Fax: 0269 846281
MR-IR-2ub

INSTRUCTUNI DE AUTORECOLTARE PENTRU UROCULTURĂ-bărbați

- Se recoltează prima urină de dimineață, după cel puțin 3 ore de la micțiunea anterioară;
- se face o toaletă riguroasă cu apă și săpun a zonei genitale, după decalotarea penisului și se șterge cu un prosop curat și călcat;
- recoltarea se face din jetul mijlociu, circa 10-20 ml;
- se evita contactul recipientului steril cu pielea sau cu lenjeria;
- nu se va depăși intervalul de 1 oră și 30 min. între momentul recoltării și cel al prezentării probei la laborator;
- dacă depășiți timpul de transport, imediat după recoltare urina se poate depozita la frigider (2-3 ore) până în momentul transportului la laborator;
- nu se recoltează proba în timpul tratamentului cu antibiotice sau antimicotice;

Dacă sunteți alergic la antibiotice vă rugăm să anunțați asistenta când aduceți proba la laborator!!!

- Va rugăm să închideți etans capacul și transportați recipientul în condiții de siguranță prevenind contaminarea dumneavoastră și a celor din jur!

Vă mulțumim că ați apelat la serviciile noastre medicale!



SC DOBSI MED SRL
Str. Turnului Nr. 12, Tel/Fax: 0269 846281
MR-IR-2uf

INSTRUCTIUNI DE AUTORECOLTARE PENTRU UROCULTURĂ-femei

- se recoltează de către pacientă, la domiciliu, **în urocultor steril, prima urină de dimineață**, după cel puțin 3 ore de la micțiunea anterioară;
- se face o toaletă riguroasă cu apă și săpun a zonei genitale, se șterge cu un prosop curat și călcat;
- recoltarea se face **din jetul mijlociu**, 10-20 ml, după introducerea prealabilă a unui tampon intravaginal (cu excepția gravidelor la care nu este indicată folosirea acestora);
- a se evita contactul recipientului steril cu pielea sau cu lenjeria;
- a nu se depăși **intervalul de 1 oră și 30 min.** între momentul recoltării și cel al prezentării probei la laborator; iar dacă se depășește timpul de transport, imediat după recoltare, urina se poate depozita la frigider (2-3 ore) până în momentul transportului la laborator;
- nu se recoltează proba în timpul tratamentului cu antibiotice sau antimicotice; ***Dacă sunteți alergică la antibiotice vă rugăm să anunțați la laborator!!!***

Vă rugăm să anunțați dacă sunteți însărcinată!

- Va rugăm să închideți etans capacul și transportați recipientul în condiții de siguranță prevenind contaminarea dumneavoastră și a celor din jur!

Vă mulțumim că ați apelat la serviciile noastre medicale!